



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl

INFORMATOR METEOROLOGICZNY LMM

NUMER 53 / CZERWIEC 2025
DRUGA DEKADA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

modele.imgw.pl

Spis treści

1. Wstęp

str. 3

str. 4

2. Minimalna temperatura powietrza

3. Maksymalna temperatura powietrza

str. 6

str. 8

4. Średnia temperatura powietrza

5. Opad atmosferyczny

str. 9

str. 12

6. Liczba wyładowań doziemnych

7. Grubość pokrywy śnieżnej

str. 13

str. 14

8. Uśłonecznienie

Uwaga. Rozpowszechnianie danych zawartych w Informatorze Meteorologicznym dozwolone jest wyłącznie z podaniem IMGW-PIB jako źródła informacji. Opublikowane dane pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji. Nie mogą one służyć jako materiał dowodowy w sprawach procesowych.

W Informatorze Meteorologicznym LMM drugiej dekady czerwca 2025 roku wykorzystano dane pomiarowe ze stacji synoptycznych sieci pomiarowo-obszerwacyjnej Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej (PSHM). W podsumowaniu nie uwzględniono wysokogórskich obserwatoriów meteorologicznych na Śnieżce i Kasprowym Wierchu (z wyjątkiem danych grubości pokrywy śnieżnej). Opublikowane dane, w czasie lokalnym, pochodzą z operacyjnej bazy danych, które po kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie.

O znaczeniu pomiarów meteorologicznych

Stacje meteorologiczne funkcjonujące w ramach ustalonych i jednorodnych standardów Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) są najistotniejszym źródłem obserwacji i pomiarów meteorologicznych. Prowadzenie ciągłych, o stałych porach i jednorodnych pomiarów pozwala śledzić i porównywać zmiany zachodzące w atmosferze. Choć nie wszystkie mają charakter ciągły i obszarowy, stąd zdarza się, że nie zostaną zarejestrowane na danej stacji. Osłoną meteorologiczną i hydrologiczną kraju zajmuje się Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna działająca w ramach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego. Zjawiska zachodzące w atmosferze podlegają zmienności w czasie i przestrzeni, wobec czego – w celu prowadzenia skutecznej osłony – wymagają zapewnienia i utrzymania odpowiedniej i reprezentatywnej dla obszaru osłony liczby stacji meteorologicznych. Dane pochodzące ze stacji meteorologicznych są podstawowym źródłem informacji o bieżącej pogodzie. To na ich podstawie powstają ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne, opracowywane są synoptyczne prognozy pogody, powstają ekspertyzy czy badania naukowe, których wyniki wspierają również rozwój innych dziedzin czy sektorów gospodarki. Dane pochodzące z obserwacji są niezbędne do przeprowadzenia symulacji numerycznych procesów fizycznych w atmosferze przy użyciu numerycznych modeli pogody.


Stacje synoptyczne

Obecnie na świecie funkcjonuje około 10 000 stacji synoptycznych (WMO). Stacje te szyfrują dane za pomocą ustalonego międzynarodowego klucza do szyfrowania wyników przyziemnych obserwacji meteorologicznych dla celów synoptycznych i w możliwie najszybszym czasie przesyłają je do krajowych biur meteorologicznych w postaci depeszy SYNOP, a stamtąd po weryfikacji trafiają do wspólnej sieci i dostępne są również w krajowych, regionalnych i światowych centrach meteorologicznych. Każda służba na świecie dysponuje danymi ze swojego obszaru oraz z obszarów osłony zlokalizowanych na powierzchni całej kuli ziemskiej. Pogoda nie ogranicza się do obszaru danego państwa, lecz jest ponadnarodowa, a jeden proces daleko od granic czy kontynentu potrafi uruchomić lawinę innych, co wpływa na pogodę w pozostałych częściach globu. Pomiary na stacjach synoptycznych wykonywane są o każdej pełnej godzinie czasu uniwersalnego (UTC) i kodowane według formatu depeszy SYNOP. Obserwacje meteorologiczne dla celów synoptycznych prowadzone są bez przerwy przez 24 godziny. Obserwatorzy stacji obserwują pogodę na bieżąco, notując rodzaj zjawiska, czas jego rozpoczęcia i zakończenia. O pełnej godzinie obserwator dokonuje odczytu temperatury powietrza, temperatury termometru zwilżonego, ciśnienia, kierunku i prędkości wiatru, określa widzialność, tendencję ciśnienia. Notuje informacje o wysokości opadu oraz o jego rodzaju. Szyfruje pogodę bieżącą i ubiegłą oraz określa rodzaj, gatunek i odmianę chmur występujących na niebie. W okresie zimowym określa stan pokrywy oraz grubość pokrywy i wysokość śniegu świeżo spadłego. Na podstawie pomiarów podaje się maksymalną i minimalną temperaturę powietrza, dokonuje się odczytu temperatury przy powierzchni gruntu oraz określa się średnią dobową istotnych pól meteorologicznych.

2. Minimalna temperatura powietrza



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl




Druka dekada miesiąca

W nocy (od godziny 20:00 do 8:00) najniższą minimalną temperaturę powietrza zarejestrowano 13 czerwca na stacji synoptycznej w Resku (2,7°C). Najwyższą minimalną temperaturę powietrza zarejestrowano 18 czerwca na stacji synoptycznej w Zielonej Górze (17,5°C).



Temperatura minimalna

CZERWIEC
2025
2 dekada



10.0°C
Przemyśl, Zielona G.
2.7°C
Resko

Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal




MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl

Przebieg dobowy temperatury powietrza charakteryzowany jest przez podanie jej najniższej i najwyższej wartości, to znaczy temperatury minimalnej w nocy i maksymalnej w dzień. Gdy czas występowania temperatury minimalnej bądź maksymalnej różni się od typowego, dobowego przebiegu temperatury, wtedy określa się termin jej wystąpienia.

Dane pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji.

Resko



Minimalna temperatura
powietrza od 11 do
20 czerwca 2025 roku

Resko 13.06.2025
(woj. zachodniopomorskie)


2,7°C

3. Maksymalna temperatura powietrza




MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl


Temperatura maksymalna
Środa
11.06.2025
08:00-20:00




Temperatura maksymalna
Czwartek
12.06.2025
08:00-20:00




Temperatura maksymalna
Piątek
13.06.2025
08:00-20:00




Temperatura maksymalna
Sobota
14.06.2025
08:00-20:00




Temperatura maksymalna
Niedziela
15.06.2025
08:00-20:00




Temperatura maksymalna
Poniedziałek
16.06.2025
08:00-20:00




Temperatura maksymalna
Wtorek
17.06.2025
08:00-20:00




Temperatura maksymalna
Środa
18.06.2025
08:00-20:00



Temperatura maksymalna
Czwartek
19.06.2025
08:00-20:00



Temperatura maksymalna
Piątek
20.06.2025
08:00-20:00




Druga dekada miesiąca

W dzień (od godziny 8:00 do 20:00) najniższą maksymalną temperaturę powietrza zarejestrowano 12 czerwca w Elblągu (13,6°C). Najwyższą maksymalną temperaturę powietrza odnotowano 15 czerwca w Ślubicach (32,8°C).



Temperatura maksymalna

CZERWIEC
2025
2 dekada



32.8°C
Ślubice
22.0°C
Hel

Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal




MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl

Przebieg dobowy temperatury powietrza charakteryzowany jest przez podanie jej najniższej i najwyższej wartości, to znaczy temperatury minimalnej w nocy i maksymalnej w dzień. Gdy czas występowania temperatury minimalnej bądź maksymalnej różni się od typowego, dobowego przebiegu temperatury, wtedy określa się termin jej wystąpienia.

Dane pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji.

Słubice



**Maksymalna temperatura
powietrza od 11 do
20 czerwca 2025 roku**


**Słubice 15.06.2025
(woj. lubuskie)**

32,8°C

4. Średnia temperatura powietrza



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl



Druga dekada miesiąca


Najniższą średnią dobową temperaturę powietrza zanotowano 12 czerwca w Elblągu (11,1°C) a najwyższą średnią dobową temperaturę powietrza zarejestrowano 15 czerwca w Słubicach (23,5°C).

Najniższą średnią dobową (obszarową) temperaturę powietrza zanotowano 12 czerwca (13,9°C) a najwyższą 18 czerwca (19,3°C).



Średnia temperatura

CZERWIEC
2025
2 dekada



Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl

Druga dekada miesiąca na stacjach synoptycznych zakończyła się dodatnią średnią temperaturą powietrza. W ciągu tych dziesięciu dni najniższą średnią temperaturę odnotowano w Zakopanem (14,2°C), a najwyższą w Słubicach (18,7°C).


Dane pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji.

5. Opad atmosferyczny



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl


Suma opadu
Środa / Czw.
11.06.25 / 12.06.25
08:00-08:00



Suma opadu
Czwartek / Pt.
12.06.25 / 13.06.25
08:00-08:00




Suma opadu
Piątek / Sob.
13.06.25 / 14.06.25
08:00-08:00




Suma opadu
Sobota / Niedz.
14.06.25 / 15.06.25
08:00-08:00




Suma opadu
Niedziela / Pon.
15.06.25 / 16.06.25
08:00-08:00




Suma opadu
Poniedziałek / Wt.
16.06.25 / 17.06.25
08:00-08:00




Suma opadu
Wtorek / Śr.
17.06.25 / 18.06.25
08:00-08:00




Suma opadu
Środa / Czw.
18.06.25 / 19.06.25
08:00-08:00



Suma opadu
Czwartek / Pt.
19.06.25 / 20.06.25
08:00-08:00



Suma opadu
Piątek / Sob.
20.06.25 / 21.06.25
08:00-08:00



Druga dekada miesiąca


W drugiej dekadzie miesiąca najwyższą dobową sumę opadu atmosferycznego odnotowano 16 czerwca (dość opadowa*) w Zakopanem (43,8 mm).

*Pomiar opadu wykonywany jest o godz. 6:00 UTC (dla Polski lokalny czas zimowy +1 godz., lokalny czas letni +2 godz.) i obejmuje 24 godz. okres – od godz. 6:00 UTC dnia poprzedzającego pomiar do godz. 6:00 UTC w dniu wykonania pomiaru. Po wykonaniu pomiaru opadu jego wysokość zapisana zostaje pod datą dnia poprzedzającego (1,0 mm = 1 litr/m²).



Suma opadu

CZERWIEC
2025
2 dekada



Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal




MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl

W okresie drugiej dekady czerwca najwyższa suma opadu wystąpiła w Zakopanem (43,8 mm).

Zakopane

Toruń



**Maksymalna suma opadu
atmosferycznego od 11 do
20 czerwca 2025 roku**


**Zakopane
(woj. małopolskie)**

43,8 mm

**Minimalna suma opadu
atmosferycznego od 11 do
20 czerwca 2025 roku**

**Toruń
(woj. kujawsko-pomorskie)**

0,0 mm




Opad całkowity – suma 24 godz. System RainGRS

System RainGRS generuje estymowane pola opadu z wysoką rozdzielczością czasową i przestrzenną (10 min, 1 km). Wejściem są dane dostarczane przez: sieć deszczomierzową IMGW-PIB, sieć radarową POLRAD uzupełnioną o dane z radarów zagranicznych, oraz satelity Meteosat. Wszystkie dane są weryfikowane i korygowane dedykowanymi algorytmami. Łączenie poszczególnych danych wejściowych odbywa się za pomocą algorytmu kombinacji warunkowej, uwzględniającego także ilościową informację o rozkładzie przestrzennym ich jakości.

Dzień	Maksymalna dobowa* wartość opadu
12 czerwca	12,4 mm
13 czerwca	2,5 mm
14 czerwca	26,1 mm
15 czerwca	33,4 mm
16 czerwca	86,7 mm
17 czerwca	89,1 mm
18 czerwca	4,2 mm
19 czerwca	2,1 mm
20 czerwca	8,3 mm
21 czerwca	3,8 mm

*Suma dobowa obejmuje okres od godz. 6:00 UTC (dla Polski lokalny czas zimowy +1 godz., lokalny czas letni +2 godz.) dnia poprzedniego do godz. 6:00 UTC dnia bieżącego i zapisywana jest pod datą końcową okresu sumowania (1,0 mm = 1 litr/m²).

6. Liczba wyładowań doziemnych



Liczba wyładowań doziemnych CG – suma 24 godz.

Dane o wyładowaniach atmosferycznych dostarczane są przez automatyczny system PERUN działający w oparciu o rejestrację towarzyszących wyładowaniom sygnałów radiowych ultrakrótkich VHF i długich LF. Lokalizuje on wyładowania doziemne z dokładnością przestrzenną do 0,5 km i skutecznością około 95%. Dane z tego systemu generowane są co minutę w postaci raportów informujących o poszczególnych wyładowaniach. Dane dostarczane przez system detekcji wyładowań burzowych PERUN są przetwarzane aplikacją LIGHTNING, która przeprowadza kontrolę ich jakości w oparciu o dane radarowe i generuje mapy obrazujące liczbę wyładowań w okręgu o promieniu 5 km w ciągu ostatnich 10 min. Generowane są pola z liczbą wyładowań doziemnych (CG) z rozdzielczością przestrzenną 1 km.

Dzień	Maksymalna liczba wyładowań CG
12 czerwca	15
13 czerwca	1
14 czerwca	1
15 czerwca	6
16 czerwca	118
17 czerwca	112
18 czerwca	1
19 czerwca	0
20 czerwca	23
21 czerwca	0

7. Grubość pokrywy śnieżnej



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl



Grubość
pokrywy śnieżnej

Środa
11.06.2025
08:00



brak pokrywy

Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Przedstawiane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wzrostające danych: dr. Alan Mandel



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl



Grubość
pokrywy śnieżnej

Czwartek
12.06.2025
08:00



brak pokrywy

Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Przedstawiane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wzrostające danych: dr. Alan Mandel



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl



Grubość
pokrywy śnieżnej

Piątek
13.06.2025
08:00



brak pokrywy

Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Przedstawiane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wzrostające danych: dr. Alan Mandel



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl



Grubość
pokrywy śnieżnej

Sobota
14.06.2025
08:00



brak pokrywy

Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Przedstawiane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wzrostające danych: dr. Alan Mandel



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl



Grubość
pokrywy śnieżnej

Niedziela
15.06.2025
08:00



brak pokrywy

Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Przedstawiane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wzrostające danych: dr. Alan Mandel



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl



Grubość
pokrywy śnieżnej

Poniedziałek
16.06.2025
08:00



brak pokrywy

Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Przedstawiane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wzrostające danych: dr. Alan Mandel



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl



Grubość
pokrywy śnieżnej

Wtorek
17.06.2025
08:00



brak pokrywy

Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Przedstawiane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wzrostające danych: dr. Alan Mandel



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl



Grubość
pokrywy śnieżnej

Środa
18.06.2025
08:00



brak pokrywy

Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Przedstawiane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wzrostające danych: dr. Alan Mandel



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl



Grubość
pokrywy śnieżnej

Czwartek
19.06.2025
08:00



brak pokrywy

Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Przedstawiane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wzrostające danych: dr. Alan Mandel



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl



Grubość
pokrywy śnieżnej

Piątek
20.06.2025
08:00



brak pokrywy


Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Przedstawiane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wzrostające danych: dr. Alan Mandel













MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl

Druga dekada miesiąca

W okresie drugiej dekady miesiąca nie zarejestrowano przyrostu pokrywy śnieżnej.



W czasie drugiej dekady czerwca nie zarejestrowano pokrywy śnieżnej.



Druga dekada miesiąca


W drugiej dekadzie czerwca najwyższą wartość usłonecznienia odnotowano 14 czerwca na stacji synoptycznej w Ustce (16 godzin i 24 minuty).

W okresie drugiej dekady czerwca na stacji synoptycznej w Suwałkach dopływ promieniowania słonecznego oceniono na 77 godzin i 48 minut. Natomiast w Kołobrzegu było to łącznie 125 godzin i 24 minuty.



Usłonecznienie

CZERWIEC
2025
2 dekada



125.4 godz.
Kołobrzeg

77.8 godz.
Suwałki

Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl

Usłonecznienie możliwe (czas z dopływem bezpośredniego promieniowania słonecznego w okresie dnia) dla stacji synoptycznej w Suwałkach wynosi 11 czerwca 17h 04m 48s a 20 czerwca 17h 10m 11s. Dla stacji synoptycznej w Kołobrzegu odpowiednio 11 czerwca 17h 05m 48s i 20 czerwca 17h 11m 12s.

INFORMATOR METEOROLOGICZNY LMM
NUMER 53 / CZERWIEC 2025
DRUGA DEKADA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Autor: dr Radosław Droźdź ¹

¹ Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju | Laboratorium Modelowania Meteorologicznego



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl

Dodatkowe informacje:

Laboratorium Modelowania Meteorologicznego

E-mail: modele@imgw.pl

www: modele.imgw.pl



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
01-673 Warszawa
ul. Podleśna 61