



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl

INFORMATOR METEOROLOGICZNY LMM

NUMER 90 / CZERWIEC 2026
TRZECIA DEKADA | PODSUMOWANIE MIESIĄCA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

modele.imgw.pl

Spis treści

1. Wstęp

str. 3

str. 4

2. Minimalna temperatura powietrza

3. Maksymalna temperatura powietrza

str. 6

str. 8

4. Średnia temperatura powietrza

5. Opad atmosferyczny

str. 9

str. 12

6. Liczba wyładowań doziemnych

7. Grubość pokrywy śnieżnej

str. 13

str. 14

8. Uśłonecznienie

9. Podsumowanie czerwca 2026 r.

str. 15

Uwaga. Rozpowszechnianie danych zawartych w Informatorze Meteorologicznym dozwolone jest wyłącznie z podaniem IMGW-PIB jako źródła informacji. Opublikowane dane pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji. Nie mogą one służyć jako materiał dowodowy w sprawach procesowych.

W Informatorze Meteorologicznym LMM trzeciej dekady czerwca 2026 roku i podsumowaniu miesiąca wykorzystano dane pomiarowe ze stacji synoptycznych sieci pomiarowo-obserwacyjnej Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej (PSHM). W podsumowaniu nie uwzględniono wysokogórskich obserwatoriów meteorologicznych na Śnieżce i Kasprowym Wierchu (z wyjątkiem danych grubości pokrywy śnieżnej). Opublikowane dane, w czasie lokalnym, pochodzą z operacyjnej bazy danych, które po kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie.

O znaczeniu pomiarów meteorologicznych

Stacje meteorologiczne funkcjonujące w ramach ustalonych i jednorodnych standardów Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) są najistotniejszym źródłem obserwacji i pomiarów meteorologicznych. Prowadzenie ciągłych, o stałych porach i jednorodnych pomiarów pozwala śledzić i porównywać zmiany zachodzące w atmosferze. Choć nie wszystkie mają charakter ciągły i obszarowy, stąd zdarza się, że nie zostaną zarejestrowane na danej stacji. Osłoną meteorologiczną i hydrologiczną kraju zajmuje się Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna działająca w ramach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego. Zjawiska zachodzące w atmosferze podlegają zmienności w czasie i przestrzeni, wobec czego – w celu prowadzenia skutecznej osłony – wymagają zapewnienia i utrzymania odpowiedniej i reprezentatywnej dla obszaru osłony liczby stacji meteorologicznych. Dane pochodzące ze stacji meteorologicznych są podstawowym źródłem informacji o bieżącej pogodzie. To na ich podstawie powstają ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne, opracowywane są synoptyczne prognozy pogody, powstają ekspertyzy czy badania naukowe, których wyniki wspierają również rozwój innych dziedzin czy sektorów gospodarki. Dane pochodzące z obserwacji są niezbędne do przeprowadzenia symulacji numerycznych procesów fizycznych w atmosferze przy użyciu numerycznych modeli pogody.


Stacje synoptyczne

Obecnie na świecie funkcjonuje około 10 000 stacji synoptycznych (WMO). Stacje te szyfrują dane za pomocą ustalonego międzynarodowego klucza do szyfrowania wyników przyziemnych obserwacji meteorologicznych dla celów synoptycznych i w możliwie najszybszym czasie przesyłają je do krajowych biur meteorologicznych w postaci depeszy SYNOP, a stamtąd po weryfikacji trafiają do wspólnej sieci i dostępne są również w krajowych, regionalnych i światowych centrach meteorologicznych. Każda służba na świecie dysponuje danymi ze swojego obszaru oraz z obszarów osłony zlokalizowanych na powierzchni całej kuli ziemskiej. Pogoda nie ogranicza się do obszaru danego państwa, lecz jest ponadnarodowa, a jeden proces daleko od granic czy kontynentu potrafi uruchomić lawinę innych, co wpływa na pogodę w pozostałych częściach globu. Pomiary na stacjach synoptycznych wykonywane są o każdej pełnej godzinie czasu uniwersalnego (UTC) i kodowane według formatu depeszy SYNOP. Obserwacje meteorologiczne dla celów synoptycznych prowadzone są bez przerwy przez 24 godziny. Obserwatorzy stacji obserwują pogodę na bieżąco, notując rodzaj zjawiska, czas jego rozpoczęcia i zakończenia. O pełnej godzinie obserwator dokonuje odczytu temperatury powietrza, temperatury termometru zwilżonego, ciśnienia, kierunku i prędkości wiatru, określa widzialność, tendencję ciśnienia. Notuje informacje o wysokości opadu oraz o jego rodzaju. Szyfruje pogodę bieżącą i ubiegłą oraz określa rodzaj, gatunek i odmianę chmur występujących na niebie. W okresie zimowym określa stan pokrywy oraz grubość pokrywy i wysokość śniegu świeżo spadłego. Na podstawie pomiarów podaje się maksymalną i minimalną temperaturę powietrza, dokonuje się odczytu temperatury przy powierzchni gruntu oraz określa się średnią dobową istotnych pól meteorologicznych.

2. Minimalna temperatura powietrza



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl



Trzecia dekada miesiąca


W nocy (od godziny 20:00 do 8:00) najniższą minimalną temperaturę powietrza zarejestrowano 23 czerwca na stacji synoptycznej w Resku (5,5°C). Najwyższą minimalną temperaturę powietrza zarejestrowano 28 czerwca na stacji synoptycznej w Zielonej Górze (25,4°C - noc tropikalna*). Noc tropikalna wystąpiła w kraju w okresie siedmiu nocy.

*Noc tropikalna to taka, podczas której temperatura powietrza nie spada poniżej 20°C.



Temperatura minimalna

CZERWIEC
2026
3 dekada



15.3°C
Zielona G.

5.5°C
Resko

Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal




MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl

Przebieg dobowy temperatury powietrza charakteryzowany jest przez podanie jej najniższej i najwyższej wartości, to znaczy temperatury minimalnej w nocy i maksymalnej w dzień. Gdy czas występowania temperatury minimalnej bądź maksymalnej różni się od typowego, dobowego przebiegu temperatury, wtedy określa się termin jej wystąpienia.

Dane pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji.

Resko



Minimalna temperatura
powietrza od 21 do
30 czerwca 2026 roku

Resko 23.06.2026
(woj. zachodniopomorskie)


5,5°C

3. Maksymalna temperatura powietrza




MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl


Temperatura maksymalna
Niedziela
21.06.2026
08:00-20:00




Temperatura maksymalna
Poniedziałek
22.06.2026
08:00-20:00




Temperatura maksymalna
Wtorek
23.06.2026
08:00-20:00




Temperatura maksymalna
Środa
24.06.2026
08:00-20:00




Temperatura maksymalna
Czwartek
25.06.2026
08:00-20:00




Temperatura maksymalna
Piątek
26.06.2026
08:00-20:00




Temperatura maksymalna
Sobota
27.06.2026
08:00-20:00




Temperatura maksymalna
Niedziela
28.06.2026
08:00-20:00



Temperatura maksymalna
Poniedziałek
29.06.2026
08:00-20:00



Temperatura maksymalna
Wtorek
30.06.2026
08:00-20:00




Trzecia dekada miesiąca

W dzień (od godziny 8:00 do 20:00) najniższą maksymalną temperaturę powietrza zarejestrowano 23 czerwca w Ustce (18,9°C). Najwyższą maksymalną temperaturę powietrza odnotowano 28 czerwca w Słubicach (40,5°C).



Temperatura maksymalna

CZERWIEC 2026
3 dekada



40.5°C
Słubice
31.1°C
Zakopane

Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal




MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl

Przebieg dobowy temperatury powietrza charakteryzowany jest przez podanie jej najniższej i najwyższej wartości, to znaczy temperatury minimalnej w nocy i maksymalnej w dzień. Gdy czas występowania temperatury minimalnej bądź maksymalnej różni się od typowego, dobowego przebiegu temperatury, wtedy określa się termin jej wystąpienia.

Dane pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji.

Słubice



Maksymalna temperatura
powietrza od 21 do
30 czerwca 2026 roku


Słubice 28.06.2026
(woj. lubuskie)

40,5°C

4. Średnia temperatura powietrza



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl



Trzecia dekada miesiąca


Najniższą średnią dobową temperaturę powietrza zanotowano 23 czerwca w Łebie (15,2°C) a najwyższą średnią dobową temperaturę powietrza zarejestrowano 28 czerwca w Zielonej Górze i 29 czerwca w Kozienicach (32,3°C).

Najniższą średnią dobową (obszarową) temperaturę powietrza zanotowano 23 czerwca (19,1°C) a najwyższą 28 czerwca (28,5°C).



Średnia temperatura

CZERWIEC
2026
3 dekada



25.7°C Warszawa
20.6°C Łeba

Opracowane na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal




MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl

W ciągu dziesięciu dni najniższą średnią temperaturę powietrza odnotowano w Łebie (20,6°C), a najwyższą w Warszawie (25,7°C).

Dane pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji.

Suma opadu
Niedziela / Pon.
21.06.26 / 22.06.26
08:00-08:00



Suma opadu
Poniedziałek / Wt.
22.06.26 / 23.06.26
08:00-08:00



Suma opadu
Wtorek / Śr.
23.06.26 / 24.06.26
08:00-08:00



Suma opadu
Środa / Czw.
24.06.26 / 25.06.26
08:00-08:00



Suma opadu
Czwartek / Pt.
25.06.26 / 26.06.26
08:00-08:00




Suma opadu
Piątek / Sob.
26.06.26 / 27.06.26
08:00-08:00




Suma opadu
Sobota / Niedz.
27.06.26 / 28.06.26
08:00-08:00




Suma opadu
Niedziela / Pon.
28.06.26 / 29.06.26
08:00-08:00



Suma opadu
Poniedziałek / Wt.
29.06.26 / 30.06.26
08:00-08:00



Suma opadu
Wtorek / Śr.
30.06.26 / 01.07.26
08:00-08:00



Trzecia dekada miesiąca


W trzeciej dekadzie miesiąca najwyższą sumę dobową opadu atmosferycznego odnotowano 30 czerwca (dość opadowa*) w Szczecinku (51,0 mm).

*Pomiar opadu wykonywany jest o godz. 6:00 UTC (dla Polski lokalny czas zimowy +1 godz., lokalny czas letni +2 godz.) i obejmuje 24 godz. okres – od godz. 6:00 UTC dnia poprzedzającego pomiar do godz. 6:00 UTC w dniu wykonania pomiaru. Po wykonaniu pomiaru opadu jego wysokość zapisana zostaje pod datą dnia poprzedzającego (1,0 mm = 1 litr/m²).



Suma opadu

CZERWIEC
2026
3 dekada



0 mm
Białystok, Kołobrzeg,

Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl

W okresie trzeciej dekady czerwca najwyższą sumę opadu wystąpiła w Szczecinku (51,6 mm).



**Maksymalna suma opadu
atmosferycznego od 21 do
30 czerwca 2026 roku**











**Szczecinek
(woj. zachodniopomorskie)**

51,6 mm

**Minimalna suma opadu
atmosferycznego od 21 do
30 czerwca 2026 roku**

5 stacji synoptycznych

0,0 mm



Opad całkowity – suma 24 godz. System RainGRS

System RainGRS generuje estymowane pola opadu z wysoką rozdzielczością czasową i przestrzenną (10 min, 1 km). Wejściem są dane dostarczane przez: sieć deszczomierzową IMGW-PIB, sieć radarową POLRAD uzupełnioną o dane z radarów zagranicznych, oraz satelity Meteosat. Wszystkie dane są weryfikowane i korygowane dedykowanymi algorytmami. Łączenie poszczególnych danych wejściowych odbywa się za pomocą algorytmu kombinacji warunkowej, uwzględniającego także ilościową informację o rozkładzie przestrzennym ich jakości.


Dzień	Maksymalna dobowa* wartość opadu
22 czerwca	98,6 mm
23 czerwca	64,9 mm
24 czerwca	40,6 mm
25 czerwca	6,4 mm
26 czerwca	3,9 mm
27 czerwca	2,9 mm
28 czerwca	48,8 mm
29 czerwca	85,2 mm
30 czerwca	108,5 mm
1 lipca	82,8 mm

*Suma dobowa obejmuje okres od godz. 6:00 UTC (dla Polski lokalny czas zimowy +1 godz., lokalny czas letni +2 godz.) dnia poprzedniego do godz. 6:00 UTC dnia bieżącego i zapisywana jest pod datą końcową okresu sumowania (1,0 mm = 1 litr/m²).

6. Liczba wyładowań doziemnych



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl



Liczba wyładowań doziemnych CG – suma 24 godz.

Dane o wyładowaniach atmosferycznych dostarczane są przez automatyczny system PERUN działający w oparciu o rejestrację towarzyszących wyładowaniom sygnałów radiowych ultrakrótkich VHF i długich LF. Lokalizuje on wyładowania doziemne z dokładnością przestrzenną do 0,5 km i skutecznością około 95%. Dane z tego systemu generowane są co minutę w postaci raportów informujących o poszczególnych wyładowaniach. Dane dostarczane przez system detekcji wyładowań burzowych PERUN są przetwarzane aplikacją LIGHTNING, która przeprowadza kontrolę ich jakości w oparciu o dane radarowe i generuje mapy obrazujące liczbę wyładowań w okręgu o promieniu 5 km w ciągu ostatnich 10 min. Generowane są pola z liczbą wyładowań doziemnych (CG) z rozdzielczością przestrzenną 1 km.

Dzień	Maksymalna liczba wyładowań CG
22 czerwca	261
23 czerwca	275
24 czerwca	66
25 czerwca	0
26 czerwca	0
27 czerwca	0
28 czerwca	85
29 czerwca	311
30 czerwca	376
1 lipca	410

7. Grubość pokrywy śnieżnej



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl



**Grubość
pokrywy śnieżnej**

Niedziela
21.06.2026
08:00



Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Przedstawiane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wizualizacja danych: dr Alan Mandula

MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl



**Grubość
pokrywy śnieżnej**

Poniedziałek
22.06.2026
08:00



brak pokrywy

Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Przedstawiane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wizualizacja danych: dr Alan Mandula

MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl



**Grubość
pokrywy śnieżnej**

Wtorek
23.06.2026
08:00



brak pokrywy

Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Przedstawiane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wizualizacja danych: dr Alan Mandula

MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl



**Grubość
pokrywy śnieżnej**

Środa
24.06.2026
08:00



brak pokrywy

Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Przedstawiane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wizualizacja danych: dr Alan Mandula

MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl



**Grubość
pokrywy śnieżnej**

Czwartek
25.06.2026
08:00



brak pokrywy

Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Przedstawiane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wizualizacja danych: dr Alan Mandula

MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl



**Grubość
pokrywy śnieżnej**

Piątek
26.06.2026
08:00



brak pokrywy

Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Przedstawiane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wizualizacja danych: dr Alan Mandula

MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl



**Grubość
pokrywy śnieżnej**

Sobota
27.06.2026
08:00



Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Przedstawiane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wizualizacja danych: dr Alan Mandula

MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl



**Grubość
pokrywy śnieżnej**

Niedziela
28.06.2026
08:00



Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Przedstawiane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wizualizacja danych: dr Alan Mandula

MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl



**Grubość
pokrywy śnieżnej**

Poniedziałek
29.06.2026
08:00



Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Przedstawiane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wizualizacja danych: dr Alan Mandula

MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl



**Grubość
pokrywy śnieżnej**

Wtorek
30.06.2026
08:00




Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Przedstawiane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wizualizacja danych: dr Alan Mandula











MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl

Trzecia dekada miesiąca

W okresie trzeciej dekady miesiąca nie zarejestrowano przyrostu pokrywy śnieżnej.



W czasie trzeciej dekady czerwca nie zarejestrowano pokrywy śnieżnej.



Trzecia dekada miesiąca


W trzeciej dekadzie czerwca najwyższą wartość usłonecznienia zarejestrowano 23 czerwca na stacji synoptycznej w Helu (16 godzin i 18 minut).

W okresie trzeciej dekady czerwca na stacji synoptycznej w Helu dopływ promieniowania słonecznego oceniono na 142 godziny i 42 minuty.



Usłonecznienie

CZERWIEC
2026
3 dekada



142.7 godz.
Hel

90.0 godz.
Zakopane

Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal




MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl

Usłonecznienie możliwe (czas z dopływem bezpośredniego promieniowania słonecznego w okresie dnia) dla stacji synoptycznej w Helu wynosi 21 czerwca 17h 17m 04s a 30 czerwca 17h 12m 08s.



Średnia
temperatura

CZERWIEC
2026



Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych.
Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie
Wizualizacja danych: dr Alan Mandal



Podsumowanie czerwca 2026 r. Średnia temperatura powietrza


Najniższą średnią miesięczną temperaturę powietrza zarejestrowano w Zakopanem (16,3°C) a najwyższą średnią miesięczną temperaturę powietrza zanotowano w Rzeszowie (20,2°C).

Wstępnie średnia obszarowa temperatura powietrza w czerwcu 2026 r. wyniosła w Polsce 18,9°C.



+ Anomalia
- temperatury

CZERWIEC
2026



Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych.
Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie
Wartość anomalii obliczona względem normy (1991-2020) dla całego miesiąca
Wizualizacja danych: dr Alan Mandal




Podsumowanie czerwca 2026 r. Anomalia temperatury powietrza

Najniższą anomalię średniej miesięcznej temperatury powietrza zarejestrowano w Mikołajkach (1,4°C) a najwyższą anomalię średniej miesięcznej temperatury powietrza zanotowano w Zielonej Górze (2,8°C).

Wstępnie obszarowa anomalia* średniej miesięcznej temperatury powietrza wyniosła 2,1°C.

*Anomalia wyliczona dla wielolecia 1991 - 2020.



Temperatura minimalna
CZERWIEC 2026

9.6°C
Ustka
3.5°C
Jelenia G.

Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych.
 Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie
 Wizualizacja danych: dr Alan Mandal


MODELE
 IMGW-PIB
 modele.imgw.pl

**Podsumowanie czerwca 2026 r.
 Minimalna temperatura powietrza**

Najniższą minimalną temperaturę powietrza zarejestrowano w Jeleniej Górze (3,5°C) a najwyższą minimalną temperaturę powietrza zanotowano w Ustce (9,6°C).


Temperatura maksymalna
CZERWIEC 2026

40.5°C
Słubice
31.1°C
Zakopane


Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych.
 Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie
 Wizualizacja danych: dr Alan Mandal


MODELE
 IMGW-PIB
 modele.imgw.pl

**Podsumowanie czerwca 2026 r.
 Maksymalna temperatura powietrza**

Najniższą maksymalną temperaturę powietrza zarejestrowano w Zakopanem (31,1°C) a najwyższą maksymalną temperaturę powietrza zanotowano w Słubicach (40,5°C).

Jelenia Góra




Minimalna temperatura
powietrza od 1 do
30 czerwca 2026 roku

Jelenia Góra 12.06.2026
(woj. dolnośląskie)

3,5°C

Słubice



**Maksymalna temperatura
powietrza od 1 do
30 czerwca 2026 roku**


**Słubice 28.06.2026
(woj. lubuskie)**

40,5°C



Suma opadu

**CZERWIEC
2026**



32.3 mm
Zamość

Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych.
Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie
Wizualizacja danych: dr Alan Mandal



MODELE
 IMGW-PIB
 modele.imgw.pl


Podsumowanie czerwca 2026 r. Suma opadu atmosferycznego

Najniższą sumę opadu atmosferycznego zarejestrowano w Zamościu (32,3 mm) a najwyższą sumę opadu atmosferycznego zanotowano w Zakopanem (140,8 mm).



Anomalia opadów

**CZERWIEC
2026**



200%
Leszno

51%
Rzeszów

Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych.
Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie
Wartość anomalii obliczona względem normy (1991-2020) dla całego miesiąca
Wizualizacja danych: dr Alan Mandal




MODELE
 IMGW-PIB
 modele.imgw.pl

Podsumowanie czerwca 2026 r. Anomalia opadu atmosferycznego

W Rzeszowie anomalia sumy opadu atmosferycznego stanowiła 51% średniego miesięcznego opadu z lat 1991 – 2020. Natomiast w Lesznie anomalia sumy opadu atmosferycznego wyniosła 200% średniego miesięcznego opadu z lat 1991 – 2020.

Zakopane

Zamość



Maksymalna suma opadu
atmosferycznego od 1 do
30 czerwca 2026 roku


Zakopane
(woj. małopolskie)

140,8 mm

Minimalna suma opadu
atmosferycznego od 1 do
30 czerwca 2026 roku

Zamość
(woj. lubelskie)

32,3 mm



Podsumowanie czerwca 2026 r. Maksymalna grubość pokrywy śnieżnej

W czerwcu 2026 r. nie zarejestrowano przyrostu pokrywy śnieżnej.


Dane pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji.



Powierzchnia Polski pokryta śniegiem wg danych Centrum Badań Kosmicznych PAN.

„Wykres pokazuje jaki procent powierzchni Polski jest pokryty śniegiem w bieżącym sezonie (czerwona linia). Dla porównania, naniesiona jest także wartość średnia z wielolecia, wskazująca jaka część Polski bywa (średnio) pokryta śniegiem w danym dniu roku (linia niebieska w tle).”

Źródło: <https://cbkpan.pl/snieg/>



Usłonecznienie
**CZERWIEC
2026**

318.9 godz.
Hel
183.6 godz.
Zakopane

Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych.
 Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie
 Wizualizacja danych: dr Alan Mandal


MODELE
 IMGW-PIB
 modele.imgw.pl

**Podsumowanie czerwca 2026 r.
Suma usłonecznienia**

W czerwcu 2026 r. na stacji synoptycznej w Zakopanem dopływ promieniowania słonecznego oceniono na 183 godziny i 36 minut. Natomiast w Helu było to łącznie 318 godzin i 54 minuty.


**+ Anomalia
- usłonecznienia**
**CZERWIEC
2026**

122%
Racibórz
90%
Mikołajki

Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych.
 Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie
 Wartość anomalii obliczona względem normy (1991-2020) dla całego miesiąca
 Wizualizacja danych: dr Alan Mandal


MODELE
 IMGW-PIB
 modele.imgw.pl

**Podsumowanie czerwca 2026 r.
Anomalia usłonecznienia**

W Mikołajkach anomalia usłonecznienia stanowiła 90% średniego miesięcznego usłonecznienia z lat 1991 - 2020. Natomiast w Racibórz anomalia usłonecznienia wyniosła 122% średniego usłonecznienia z lat 1991 - 2020.

INFORMATOR METEOROLOGICZNY LMM
NUMER 90 / CZERWIEC 2026
TRZECIA DEKADA | PODSUMOWANIE MIESIĄCA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Autor: dr Radosław Droździół¹

¹ Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju | Laboratorium Modelowania Meteorologicznego



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl

Dodatkowe informacje:

Laboratorium Modelowania Meteorologicznego

E-mail: modele@imgw.pl

www: modele.imgw.pl



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
01-673 Warszawa
ul. Podleśna 61